

港区 12-15 歳対象のコナミティ集団接種アンケート
会場；総合母子保健センター愛育病院 令和3年7-8月実施

実施方法；2回目のコナミティ接種で来院時に接種者もしくは保護者にアンケートを依頼。
アンケートは google フォーム®を用いてオンラインで回答とした。

愛育病院新型コロナワクチン副反応に関するアンケート（1回目）

フォームの説明

第1回接種当日（1日目）の体調はいかがでしたか？ *

	強く出た（解熱鎮...	中程度出た（解熱...	軽度出た（解熱鎮...	出なかった
37.5℃以上の熱	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
痛み	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
頭痛	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
全身倦怠感	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

第1回接種翌日（2日目）の体調はいかがでしたか？ *


	強く出た（解熱鎮...	中程度出た（解熱...	軽度出た（解熱鎮...	出なかった
37.5℃以上の熱	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
痛み	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
頭痛	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

図；入力画面

1回目接種後アンケート(628名回答)


お子さんの年齢をお教えてください。

628件の回答



お子さんの性別をお教えてください。

628件の回答




発熱・疼痛・頭痛・倦怠感の程度の目安

強度⇒解熱鎮痛剤で改善しない程度


中度⇒解熱鎮痛剤で軽快する程度

軽度⇒解熱鎮痛剤を必要としない程度


1回目接種当日の体調




1回目接種翌日の体調



1回目接種3日目の体調



1回目接種4日目の体調



上記の他に気になる副反応はありましたか？

171 件の回答

なし

特になし

ない

無し

ないです

ありません

筋肉痛

ありませんでした

吐き気

とくになし

いいえ

特に無し

アームの若干のかゆみ

なかった

じんましん

特になし

接種した方の腕のしびれ

腕の腫れ(痛みなし)

貧血気味になり、眩暈がした

特になかった

腕が重く感じた

特になし、上記 2 日目の発熱欄で、出なかった、を選択できなかったのですが、発熱はありませんでした。

なし。

腕が痛い

睡魔

関節痛

発熱した次の日の午後、蕁麻疹が全身に出た

接種した直後、胸が苦しいような感じがした

悪寒

2 日目の朝 起きたときに 腰が痛かった

腕が上がらなくなった

副反応がなくなった後に運動をしたら、摂取した方の腕と両足が痺れた。

かなり緊張していたためか接種直後、吐気と顔色不良。

打った周りに発疹

ありませんでした。

接種 4 日後以降 5 日間ほど鼻血が出たこと

脇腹と左中指先が痛くなった

ないです。

なかった。

立ちくらみ

特には無かったです

接種後、数日間鼻水が出てました。

ワクチン打った方の手が浮腫んだ

接種部位の痛み

少しぼーとした

1 週間後頭が痛くありませんでした。寝たら回復しましたからそんなにきにしていませ

無い

注射を打った直後、貧血と同じような症状が出た

肩凝り(湿布使用)

副反応が 4 日以上続いた

37.0 度の微熱が出た

無いです

特にありません

接種後、5 時間位で腕が上げにくくなった

特にありません。

身体のあちこちに蕁麻疹が出た。かゆみがある。

ワクチン接種直後にクラクラし、気持ち悪くなった。
チェックをしないと送信ができないので軽程度にチェックしました。全く無いの項目が欲しかったです。

接種後の帰宅途中、ふらつき

打った部分の腕の筋肉痛が出たくらいです

お腹が少し緩くなった

37度2分程度の微熱が10日間続き内科を受診した

少し頭が重かった

24時間後に少し接種部位が赤くなりましたが、冷やしたところすぐに赤みはひきました。

特になし。

ちょっと手が痺れた

注射を打った方じゃない方の腕がビリビリと痛くなった。

大丈夫だった

胸の痛み

少し腕が痛い

おならと、ゲップが出しにくい

腰痛、貧血ぽくなる

接種部位周辺の腫れ及び痛みが数日続き、冷やす事で対処した。

腕が上がらなくなる

寒気

主に下半身の関節の痛み

ありません。


No

特にありませんでした。

特にないです

上記の他に気になる副反応はいつ出現しましたか？

176件の回答



新型コロナワクチン接種にご意見がありましたら記載してください。

74 件の回答

特になし

ない

なし

とくになし

特に無し

早く鎮静化してほしい

受けられて感謝しています。

ご苦労さまです。これからも頑張ってください！

とても良かったです。

もっと怖いという考えを変えてほしい

希望者にコロナールの処方をしてほしかった

大変スムーズな接種、ありがとうございました。

副反応の弱いワクチンへの改良を強く希望します。

ワクチンパスポートを作れ

不公平だ😡😡😡😡😡

未成年のワクチン接種の必要性について十分な説明を受けていない

会場にわざわざ集まらず近所の小児科で受けたかった

もう少し早く摂取したかったです。

スムーズに受けられて良かったです

不安の軽減に正しい情報をタイムリーにわかりやすく、港区の学校ネットワークなどで提供して欲しい。

アメリカ製なので安心です

少し倦怠感がありました

熱は出ましたが、その他のメリットの方が大きい

意味あるんですか？

注射が怖すぎるからもっとこうなんとかして

熱が出るのは個人差ですがなんの違いですか？

全然痛くない

ないです。

とても良い。

早急に接種することが重要。港区は子供の接種も早かできており、よかった。

子供が早めに打って本当に良かったです

12 歳 15 歳に特別会場を作ってくださいって大変助かりました。場所が愛育病院で安心して接種できたと思います。子どもへの声の掛け方などすごく丁寧で、緊張もほぐれた様子でした。

周りの人が4日以上続いた人が結構いた

3回目がいつ頃必要なのか、スムーズに予約できるか心配です。

とても良いと思う

薬局でなかなか解熱剤が手に入りにくいので、解熱剤を配布して欲しかった

特にない

特にないです

本当に安全か心配

2回目の副反応が心配

針を射してる時間が長い

息子を出産しました、信頼出来る愛育病院でワクチン接種させて頂き、不安なく接種する事が出来ました。本当にありがとうございました！

特にありません

姉弟が、年齢が16歳以上と12～15歳と分かれて、接種場所が違っていたので、姉弟なら同じばで出来ると手間が省けていいと思いました。

安心しました。

スムーズに行われていて良かったと思います

12歳以上の接種を早めに始めてくださって感謝しています。病院での接種は安心感もあり、心強いです。

何から何までお世話になりました。

接種出来て、とりあえず安心。医療関係者及び様々な関係者の方々に感謝致します。


ありません。

運営もスムーズで、安心できる環境で接種していただけて感謝しております。港区の接種体制は素晴らしいと思います。


2回目接種後アンケート(284名回答)

お子さんの年齢をお教えてください。


284件の回答




お子さんの性別をお教えてください。
284件の回答




2回目接種当日の体調




2回目接種翌日の体調



2回目接種3日目の体調



2回目接種4日目の体調



上記の他に気になる副反応はありましたか？

58件の回答

なし

特になし

脇にしこりができた。

貧血

下痢 接種部分の痒み

身体全体がバキバキに痛かった

胸の痛み 違和感

嘔吐

関節痛

胸がものすごく痛かった

接種した場所が腫れ発疹が出た

胸の痛み、息苦しさが2日目に出ました。

吐き気

なし。

かゆみ

接種部位の腫れ

熱のせい、2回嘔吐しました

3日目に迷走神経反射で意識を失い倒れた

軽く下痢

腋下リンパ節の腫れ。

腹痛

失神 22時間後

肩凝り、腰痛

無いです

脚(膝下)に違和感

ずっと下痢があった、熱が 37.5-38.5 で続いている

注射した部位が当日腫れた。

ゲップとおなら

とくになし

ありませんでした。

約12時間後から著明な口渇が出現し、どんどん体調が悪くなる

他の副反応ではありませんが、接種の次の日(2日目)の夜中3時から震えが止まらないほどの寒気がして4時には39.4度、カロナールを飲んでも8時には39.5度だったのですがロキソニンを飲んで12時前に37.1度まで回復した。

普段より感情的、興奮状態が気になりました。

腰痛

1回目は同じような高熱が出ても、食欲があったが、2回目はだるさと頭痛が強く食欲がなかった。

軽度の吐き気のような気分不快

2日目に軽度の関節痛

食欲不振・吐き気

副反応がなくなった後に運動すると手足痺れる

2日目から鼻水があります。


特にありません

今日手が痛くなった。

微熱 37.3-4 度が 3、4 日目も続いた

上記の他に気になる副反応はいつ出現しましたか？

86 件の回答



新型コロナワクチン接種にご意見がありましたら記載してください。

31 件の回答

なし

特になし

接種できてよかった

日本製のワクチンを開発して欲しいです。

接種が予約できてからは何も問題なくスムーズな進行でした。

素晴らしいと思います。

愛育病院での接種は、万が一のことを考えると、安心できて良かった。

若い人は副反応が強く出ると聞いていたので身構えていたが、両親と比べると驚く程、副反応がなかった。このアンケート結果を多くの方が知る様に願っています。

アンケート調査および、途中経過の報告をありがとうございました！！大変参考になりました。周りのワクチン接種に不安を感じている同年代のお友達にもたくさんシェアさせていただきました。男女で副反応に差があるように感じますので、男女別の結果も反映頂けるとより参考になると思いました。不安を抱える親御さんも多いので、結果の反映も、メディア等広範囲にどうぞよろしくお願い致します！

いつコロナは、終わるのでしょうか？

接種部位の痛痒い感じ

3 回目以降のワクチンも 1 回目 2 回目を愛育病院で接種した人には、また同じ場所で優先的に接種できるような仕組みで案内が届くといいなと思います。

受験生です。2 月の受験期に向けてブースターは必要か新たな情報が有れば教えて頂きたいです。

港区の接種はスムーズでしたので感謝しております。

予約していてもかなり待たされるので、もう少しスムーズな接種を。

ありませんでした。

微熱程度あり

ご参考にまでに、熱は 37.1 度くらいと高くはないが、倦怠感は強く、2 日目夕方まではほぼ寝ていました。

これより辛かったら人間死んじゃう、体調がめちゃくちゃ悪い と話していました。

3 兄弟ですが、予約が一緒が取れず毎週愛育病院通いです。緊急事態宣言中でもあり兄弟は同日で接種をお願いしたいです。

熱が出た場合のために接種後に希望者にはコロナールを処方してほしい

12 歳に早急に接種していただき、感謝しています。新学期に向けて小学生が心配ですので、11 歳以下の接種も、承認され次第、早急に対処していただけたら助かります。

家族の中でも接種を受ける受けないは強要出来ないと思う。個人の意見を尊重するため。だが、高校生の子供だけ受けていないので、それが心配。受けないリスクをわかりやすいビデオまたは実体験のリアルなものがあると良いと思う。

子の 2 回目接種翌日は、保護者が仕事を有給で休めるように、政府から企業等に特別金等を出して欲しい。休校措置の時と同様のものを希望。どんな副反応が出るかわからず、中学生とはいえ子供一人にしておくのは心配であった。

今後、追加接種が必要になった場合は兄弟は一緒に予約が取れるよう考慮して欲しい。

(三兄弟の接種に、6 週間毎週通いました。)

半年後のワクチン追加接種はどうなりますか？

早めに打たせたく、予約するのに必死でした。もっと追加接種など報道されていますが、打ちたい人にはどこでも簡単に打てるようになって欲しいです。

3 回目はないですね？